

ЦИБУЛЯ РЕГЕЛЯ

Allium regelianum A. Becker ex Iljin

Родина Цибулеві - *Alliaceae*

Статус виду. Рідкісний, DD.



Наукова цінність. Причорноморсько-прикаспійський диз'юнктивний ендемік.

Загальний ареал. Східна (південна частина) Європа: Причорномор'я, Передкавказзя та Нижнє Поволжя.

Поширення виду в Україні. Лівобережний злаковий та іноді злаково-лучний степ, Кримське Присивашся.

Загальна характеристика. Багаторічна трав'яна рослина 30-60 см заввишки, з яйцеподібною цибулиною, над якою під піхвою нижнього листка є численні додаткові цибулинки. Стебло борознисте, внизу з листовими піхвами. Листки (3-4) вузькі, напівциліндричні, порожнисті, зверху жолобчасті, біля основи розширені, коротші від стебла. Суцвіття густе, багатоквіткове, з опадним покривалом. Квітки пурпурові, 3,5-4 мм завдовжки. Цвіте в першій половині липня протягом 2 тижнів. Рясність цвітіння залежить від рівня зволоженості попередніх періодів. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням і цибулинами. Характерне осіннє проростання цибулин та зимова вегетація.

Умови місцезростання. Засолені степи, солонці, подові луки.

Чисельність та стан популяцій. Локальні популяції трапляються спорадично, лише деякі з них є досить багаточисельними, більшість – малочисельні. У посушливі роки рослини пригнічені, насіннева продуктивність низька.

Головні фактори зменшення чисельності. Природні (фрагментованість ареалу, резерватна сукцесія) та антропогенні (розорювання, антропогенні зміни гідрологічного режиму, викошування травостою, механічне пошкодження на пасовищах).

Прийняті заходи охорони. Занесений до Червоної книги України, Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Зберігається на території об'єктів Смарагдової мережі: UA0000016, UA0000017, UA0000027, UA0000092, UA0000097, UA0000215.

