

Урочище „Голубічка” знаходиться в Івано-Франківській обл. (Надвірнянський р-н) біля населених пунктів Заріччя, Білі Ослави та Чорний Потік. „Голубічка” – це гірський масив (Пригорганське Передкарпаття). Площа урочища - 110 га., ботанічного заказника „Голубічка” – 39 га.

Видове різноманіття вивчали в польових умовах за допомогою маршрутного методу. Облік рясності проводили за шкалою Друде (1913). Еколого-ценотичний аналіз - за Заверухою Б. В. (1985), біоморфологічний аналіз – за Серебряковим І. Г. Визначення рослин здійснювалось за Визначником рослин Українських Карпат.

Під час досліджень виявлено 141 вид рослин з 108 родів і 40 родин. Домінуючі родини за кількістю видів: Asteraceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Rosaceae. Родина Asteraceae налічує 26 видів. Провідне місце займають види лучного цено типу - 41 флороценоелемент, на другому місці - неморальний. За спектром життєвих форм переважають трав'янисті полікарпики - 96 видів. 80 видів рослин є лікарськими, з них – 49 – неофіційні, 31 вид використовується в офіційній медицині; 42 види - декоративні; 57 - медоноси; 3 види - адвентивні рослини. На дослідженій території виявлено 4 види, занесених до Червоної Книги України (II категорія): *Astrantia major* L., *Atropa belladonna* L., *Leucosium vernum* L., *Colchicum autumnale* L. 4 види числяться в Регіональному Червоному Списку: *Gentiana asclepiadea* L., *Hepatica nobilis* Mill., *Dentaria glandulosa* Waldst et Kitt, *Equisetum majus* Gars. Останній є реліктовим видом.

Результати досліджень свідчать про високе видове різноманіття рослин даної території, отже, її необхідно повністю вилучити із господарського користування.

Н. В. Загороднюк

НОВІ ДЛЯ КЕРЧЕНЬСЬКОГО ПІВОСТРОВА ВИДИ МОХОПОДІБНИХ

Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна, netl@ksu.kherson.ua

Гора Мітрідат (висота 91 м) розташована в межах міста Керч (схід Керченського півострова). Мітрідат та його околиці почали забудовувати з VII ст. до н.е.; зараз частину гори обмежують вулиці-тераси з підпірними стінками. На Мітрідаті збереглися ділянки типчаково-ковилових та петрофітно-типчаково-ковилових степів з ознаками опустелювання та синантропізації, трапляються виходи верхньотретинних вапняків.

В березні 2003 року на північному схилі Мітрідату нами було зібрано 17 видів мохоподібних, що належать до 12 родів 5 родин порядку *Bryales*. Підтверджено наявність 12 видів, наведених для Керченського півострова (Бачурина, Мельничук, 1988, 2003; Бойко, Партика, 1990). Вперше для даної території наводяться:

Pottia lanceolata (Hedw.) S. Mill (*Pottiaceae*) – голарктичний аридал, зростає на глинистому та вапнистому ґрунті в степах. В Україні розсіяно трапляється в гірських та рівнинних районах, здебільшого в Лісостепу та Степу.

Didymodon sinuosus (Mitt.) Delonge (*Pottiaceae*) – європейсько-північноамериканський вид аридної екології, зростає на вологому вапнистому ґрунті та затінених вапняках, старих кам'яних стінах. В Україні був відомий з Біосферного заповідника “Асканія-Нова” (Херсонська обл.), долини р. Чорної (Гірський Крим) та Тарханкутського п-ва.

Pseudocrossidium revolutum (Brid.) Zander (*Pottiaceae*) – євразіо-африканський рівнинний аридал, зростає на вапнякових каменях, скелях і мурах. В Україні трапляється в лісостепових та степових районах, відомий з центральної частини Рівнинного Криму.

Tortula ruraliformis (Besch.) Grount (*Pottiaceae*) – голарктичний аридний вид, зростає на піщаних кучугурах, кам'янистих, степових схилах, пісковицях. Звичайний компонент степових ценозів України.

Schistidium apocarpum (Hedw.) V. et S. (*Grimmiaceae*) – космополітний аридал, зростає на каменях, скелях і мурах. Трапляється в гірських та рівнинних районах України. Для Рівнинного Криму вказаний вперше.

Також на схилах Мітрідату було виявлено два рідкісних види: *Bryum torquescens* V. et S. (*Bryaceae*) – аридний вид з біполярним ареалом, в Україні зростає лише на кам'янистих відслоненнях Кримського п-ва; *Rhynchostegium megapolitanum* (Web. et Mohr.) V., S. et G. var. *meridionale* Schimp. (*Brachytheciaceae*) – середземноморський вид, зрідка трапляється в Закарпатті, на Північному березі Криму та Рівнинному Криму на відкритих трав'янистих піскуватих місцях, в освітлених чагарниках.