

РОЗДІЛ 2
РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ТА ПРОБЛЕМИ
ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

УДК 37.037

Андреєва Р. І., к.фіз.вих., старший викладач (Херсонський державний університет)

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СТЕП-АЕРОБІКОЮ НА ОРГАНІЗМ ЖІНОК 25-40 РОКІВ

Анотація. У статті розглянуті основні питання організації заняття зі степ-аеробіки для жінок 25-40 років. Доведений позитивний вплив степ-аеробіки на морфо-функціональний стан, фізичну працездатність жінок.

Ключові слова: степ-аеробіка, фізичний розвиток, функціональний стан, фізична працездатність.

Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы организации занятий по степ-аэробике для женщин 25-40 лет. Доказано положительное влияние степ-аэробики на морфофункциональное состояние, физическую работоспособность женщин.

Ключевые слова: степ-аэробика, физическое развитие, функциональное состояние, физическая работоспособность.

Annotation. This article provides basic information about the organization of classes in step aerobics with women 25-40 years of age. The positive impact of step aerobics on morphology and function, physical performance of women is proved.

Keywords: step aerobics, physical development, functional status, physical performance

У дослідженнях вітчизняних провідних науковців неодноразово вказувалося на погіршення стану здоров'я населення та його залежність від рівня соціальних умов на 50-55 %, ступеня забруднення середовища на 20-25 %, генетичного фактору на 15-20 % та на 10-15 % від стану охорони здоров'я в країні [1; 2]. Зрозуміло, що в Україні важко створити оптимальні соціальні умови, які б сприяли здоровому способу життя всього населення, тому доцільно використовувати всі можливості та засоби для забезпечення здоров'я різних груп населення, в тому числі жінок 25-40 років [3; 4].

Різні види фізичних вправ, оздоровчих занять є одним з найефективніших засобів у боротьбі з малорухомим способом життя.

Окремі автори вважають необхідним залучити жінок до систематичних занять різними видами рухової активності, в залежності від їх індивідуальних вподобань та можливостей та пропонують наступні види оздоровчих тренувань: степ-аеробіка, аква-аеробіка, шейпінг, каланетика, різновиди танцювальної аеробіки та інші [5; 6; 7].

Тісний взаємозв'язок стану здоров'я та фізичної працездатності, об'єму та характеру рухової активності доведений багатьма фахівцями [8], які стверджують, що оптимальне фізичне навантаження з дотриманням раціонального харчування та здорового способу життя є найбільш ефективними у попередженні захворювань та збільшення тривалості життя.

Вищезазначене свідчить, що дослідження рухової активності жінок 25–40 років під час занять степ-аеробікою є досить актуальною темою, що дасть можливість покращити фізичний стан і здоров'я жінок цього вікового періоду, підвищити їх фізичну працездатність і адаптаційні можливості.

Метою роботи є визначення ефективності впливу заняття степ-аеробікою на організм жінок 25–40 років.

Для досягнення визначеної мети в статті вирішуються такі завдання:

- аналізується науково-методична та спеціальна література, яка визначає основні види оздоровчої аеробіки та розглядає питання організації та методики проведення заняття зі степ-аеробіки.

- обґрутується ефективність запропонованої методики степ-аеробіки для жінок 25–40 років.

Вперше термін “аеробіка” (“аеробний” – “кисневий”) був введений в 70-ті роки минулого сторіччя доктором Кеннетом Купером, відомим американським фахівцем в галузі фізичної культури. Так він назвав свою оздоровчу систему фізичних вправ для осіб різного віку.

Білька популярність степ-аеробіки обумовлена такими чинниками:

- по-перше, основні рухи прості і цілком доступні людям без спеціальної рухової, зокрема танцювальної, підготовки;

- по-друге, степ-аеробіка характеризується досить високою варіативністю рухів, яка залежить від рівня підготовленості. У степ-аеробіці застосовуються і найпростіші крокові рухи, що нагадують підйом і спуск по сходах, і складні хореографічні елементи, а також танцювальні рухи в їх комбінаціях різного характеру;

- по-третє, степ-платформу можна використовувати не тільки з метою виховання витривалості, в якості кардіо-тренажера, але й для силових тренувань спортсменів.

З метою доведення ефективності експериментальної методики використання спеціалізованих комплексів степ-аеробіки для заняття з жінками 25–40 років, на етапі констатуючого експерименту нами були досліджені показники фізичного розвитку та функціонального стану жінок експериментальної групи. Водночас, визначався рівень їхнього фізичного

здоров'я та фізичної працездатності. Після планомірного використання комплексів степ-аеробіки, силових вправ, тренування на витривалість та вправ на розслаблення, було проведене повторне тестування досліджуваних показників і здійснено їх порівняли з вихідними.

Стан фізичного розвитку жінок 25-40 років досліджувався за такими показниками: довжина тіла, маса тіла та окружність грудної клітки (табл. 1).

Показники фізичного розвитку жінок 25-30 років до і після експерименту (n=14)

Таблиця 1

Показники	Mx ± Smx		P
	ВД	КД	
Довжина тіла, см	167,3 1,99	168,1 1,67	> 0,05
Маса тіла, кг	61,3 0,55	58,5 0,76	< 0,001
Окружність грудної кітки, см	83,6 0,69	86,3 0,98	< 0,05
Обхват талії, см	70,3 0,55	66,1 0,76	< 0,001
Обхват стегон, см	92,4 0,69	89,1 0,98	< 0,05

Як свідчать результати проведеного дослідження, середній показник довжини тіла жінок 25-40 років до експерименту становив $167,3 \pm 1,99$ см, а після $168,1 \pm 1,67$ см. Отже, заміри довжини тіла показали, що цей показник є відносно сталою величиною і практично не змінюється в процесі фізичних навантажень. Варто зазначити, що отримані дані в ході експериментального дослідження відповідають антропометричним нормам досліджуваного контингенту.

Аналізуючи вихідні дані жінок 25-40 років, встановлено, що на етапі констатуючого експерименту показники маси тіла коливалися в широкому діапазоні: так найменший показник становив 50 кг, а найбільший – 71 кг.

Отримані дані маси тіла жінок 25-40 років після проведення експерименту і порівняння їх з вихідними дає можливість констатувати, що середній показник маси тіла жінок до експерименту становив $61,3 \pm 0,55$ кг. Після експерименту він становив $58,5 \pm 0,76$ кг.

Отже, в результаті заняття степ-аеробікою за експериментальною програмою відбулося зменшення середнього показника маси тіла на 2,8 кг, що у відсотковому значенні становить 4,6 % ($P < 0,001$). При цьому, варто зазначити, що двоє з досліджуваних жінок перед початком експерименту ставили за мету збільшити масу тіла, щоб дещо збільшились в об'ємах. Що

стосується тих жінок, які хотіли схуднути, то у них спостерігалися результати, що залежать від таких факторів, як регулярність відвідувань занять, дотримання дієти, та дотримання режиму праці і відпочинку.

Вихідні середні результати обхватів талії та стегон жінок 25-40 років були в межах норми, однак варто зазначити, що аналіз індивідуальних результатів у деяких досліджуваних виявив дуже завищенні показників обсягів талії і стегон, що свідчить про надлишок жирової тканини. Що стосується показників грудної клітки, то вони були дещо заниженими, що є результатом недостатньо розвинених м'язів грудної клітки жінок, міжреберних м'язів і м'язів спини.

Аналіз отриманих даних після проведення експерименту дозволив виявити зниження практично всіх показників в результаті спрямованого навантаження на проблемні зони: обхват талії змінився на 4,2 см (6 %), а обхват стегон на 3,4 см (3,7 %) при $P < 0,05 \div 0,001$. Збільшення середнього показника окружності грудної клітки на 2,7 см (3,2 %) при $P < 0,05$ пояснюється тим, що в процесі заняття з обтяженнями за рахунок спеціальних вправ для грудей, спини та ніг розвивається грудне дихання і змінюється м'язовий корсет тулуба. Ці показники свідчать про те, що за допомогою заняття степ-аеробікою можна здійснювати коригуючий вплив на недоліки фігури жінок 25-40 років.

Функціональний стан серцево-судинної системи жінок 25-40 років визначався за такими показниками: частота серцевих скорочень до та після навантаження, артеріальний тиск (системічний та діастолічний). Варто зазначити, що за показниками артеріального тиску в ході основного педагогічного експерименту суттєвих вірогідних змін не виявлено ($P > 0,05$) (табл. 2).

Показники частоти серцевих скорочень жінок 25-30 років в ході основного педагогічного експерименту (n=14)

Показники	Mx ± Smx		P
	ВД	КД	
До навантаження	84,7 0,62	77,2 0,51	< 0,001
Після навантаження	94,3 0,53	78,4 0,66	< 0,001

Як свідчать отримані дані, в ході експериментального дослідження відбулися значні позитивні зміни показників, які характеризують частоту серцевих скорочень (ЧСС) жінок 25-40 років: в середньому ЧСС в стані спокою зменшилася на 7,5 уд./хв., а ЧСС після навантаження в порівнянні з вихідними даними зменшилася на 15,9 уд./хв., що у відсотковому

значення становить 8,9 та 16,9 %. В обох випадках рівень вірогідності отриманих результатів $P < 0,001$. Аналіз отриманих результатів відновлення ЧСС до та після навантаження свідчать про те, що у 90 % досліджуваних жінок після експерименту ЧСС наблизилася до вихідної величини, у той час як до експерименту таких жінок у групі було 20 %. Отримані результати дають можливість стверджувати, що систематичні заняття степ-аеробікою здійснюють позитивний вплив на серцево-судинну систему, збільшують адаптаційні можливості організму до навантаження, покращують економіст роботи серця та тонус судин.

В процесі дослідження зміни динаміки фізичної працездатності жінок 25-40 років під впливом заняття степ-аеробікою, групою авторів доведено, що утримання PWC₁₇₀ та граничної фізичної працездатності на необхідному рівні мають не тільки різні фізіологічні механізми, які її підтримують, але й різну динаміку при посилені фізичних навантажень [8; 9]. Отримані середньостатистичні дані констатуючого експерименту вказують на те, що переважна більшість жінок експериментальної групи за регіональними стандартами відносяться до середнього рівня фізичної працездатності.

Так, під впливом заняття за авторською методикою у всіх експериментальних групах відбулися позитивні зміни (табл. 3).

Таблиця 3
Порівняльна характеристика показників фізичної працездатності жінок експериментальної групи (n=14)

Показник	Етапи	$M \pm S_m$	t	P
Фізична працездатність	ВД	63,6 ± 0,34	16,0	< 0,001
	КД	70,8 ± 0,29		

Як свідчать результати тестування фізичної працездатності за ПГСТ, різниця між вихідними і кінцевими результатами експериментальної групи склала 7,2 ум.од., тобто рівень фізичної працездатності жінок 25-40 років під впливом заняття степ-аеробікою покращився на 11,4 %.

Співставлення отриманих результатів з вихідними даними показало, що під впливом заняття степ-аеробікою значно покращилася фізична працездатність жінок експериментальної групи ($P < 0,001$) (табл. 4).

Отже, результати проведеного експерименту свідчать, що розвиток фізичної працездатності жінок експериментальної групи зріс з низького та нижче середнього рівня (4-32 %) і середнього (64 %) до середнього (28 %) і вище середнього та високого (32-36 %) рівнів, що, безумовно, свідчить про ефективність заняття степ-аеробікою.

Таблиця 4
Зміни якісних показників фізичної працездатності під впливом експериментальної програми

Етап	Рівні фізичної працездатності (n=14, в %)				
	низький	н/середні	Середній	в/середні	високий
ВД	4	32	64	-	-
КД	-	4	28	32	36

Примітка: ВД – вихідні дані; КД – кінцеві дані.

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок, що основним завданням оздоровчого тренування жінок першого зрілого віку, на думку багатьох науковців, є розширення функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи, зменшення маси тіла і протидія інволюційним процесам рухових функцій. Для досягнення позитивного ефекту від заняття і протидія інволюційним процесам старіння жінок 25-40 років, багато авторів рекомендують включати в систему тренувань різні види вправ аеробного і анаеробного характеру, легкоатлетичні вправи і вправи з елементами спортивних ігор, вправи на розтягнення та вправи на зміцнення м'язів і розвиток силових можливостей. Значний позитивний ефект в досягненні цієї мети дають заняття степ-аеробікою, оскільки вони дають можливість включати в тренування різноманітні вправи, які по різному впливають на організм.

В ході експериментальної роботи були виявлені значні зміни в показниках фізичного розвитку жінок експериментальної групи. Під впливом заняття степ-аеробікою маса тіла жінок зменшилася на 2,8 кг (4,6 %), обхват талії зменшився на 4,2 см (6 %), а обхват стегон на 3,4 см (3,7 %) при $P < 0,05 \div 0,001$. За результатами заміру окружності грудної клітки виявлено її збільшення на 2,7 см (3,2 % при $P < 0,05$), що пояснюється розвитком грудного дихання та зміцненням м'язового корсету тулуза.

Значні статистично вірогідні зміни відбулися за показниками функціонального стану жінок експериментальної групи. Так, ЧСС в стані спокою зменшилася на 7,5 уд./хв., а ЧСС після навантаження в порівнянні з вихідними даними зменшилася на 15,9 уд./хв., що у відсотковому значенні становить 8,9 та 16,9 % ($P < 0,001$). На фоні цих змін значно покращилася фізична працездатність жінок експериментальної групи – на 11,4 %. При цьому варто зазначити, що на етапі констатуючого експерименту рівень фізичної працездатності жінок експериментальної групи знаходився у межах низьких та середніх рівнів, в той час, як на етапі основного педагогічного експерименту 32 та 36 % жінок вже мали вище середній та високий рівень фізичної працездатності відповідно.

1. Аланасенко Г. Л. Проблемы управления здоровьем человека / Г. Л. Аланасенко, Н. П. Страпко // Наука в олимпийском спорте: специальный выпуск. – 1999. – С.56–60.
2. Куц А. С. Модельные показатели физического развития и двигательной подготовленности населения центральной Украины: [монография] / А. С. Куц. – К.: Іскра, 1993. – 256 с.
3. Булич Є. Г. Валеологія. Теоретичні Основи валеології / Булич Є. Г., Муравов И. В // Навчальний посібник. – К. ІЗМН, 1997. – 224 с.
4. Дмитрієва Н. В. Поліпараметрична технологія доклінічної діагностики стану здоров'я людини / Дмитрієва Н. В., Глазачев О. С. // Профілактика захворювань та змінення здоров'я: Науково-практичний журнал МЗ РФ, 2001. – № 6. – С. 41.
5. Анисимова М. В. Занимаясь оздоровительной аэробикой [Текст] / М. В. Анисимова // Физическая культура в школе. – 2004. – № 6 – С.29-35.
6. Бибик Р. В. Структура мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности женщин первого зрелого возраста / Р. В. Бибик, Н. Н. Гончарова, Т. А. Хабинец // Педагогика, психологія і медико-биологіческі проблеми фізичного воспитання і спорта. – 2010. – № 9. – С. 9–11.
7. Чубакова В. А. Педагогические технологии проведения занятий различными видами оздоровительной аэробики с женщинами молодого возраста: 21–35 лет: дис. ... канд. пед. наук / В. А. Чубакова. – М., 2006. – 173 с.
8. Доленко Ф. Л. Специфика воздействия оздоровительной аэробики на двигательную сферу / Ф. Л. Доленко. – Ростов н/Д : [б. и.], 1995. – С. 33-35.
9. Луценко Д. Ю. Разработка комплексов упражнений индивидуальной направленности в фитнессе и их влияние на улучшение физического состояния женщин / Д. Ю. Луценко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр. / Под ред. С. С. Ермакова. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2002. – № 7. – С. 41-50.

Рецензент: д.пед.н., профессор Куц О. С.

УДК 371: 378: 796: 004

ББК 88.3

П-86

Психологічно-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (10). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2013. – 382 с.

ISBN 978-966-7359-71-3

У збірнику подано наукові статті викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, інших ВНЗ та установ з питань розширення ролі та місця системи педагогічної освіти, фізичного виховання, спорту та здорового способу життя, обчислювальних методів, методичного і комп'ютерного моделювання у підготовці молодого покоління та формуванні традиційних цінностей як основи демократичного суспільства.

*Рекомендовано до друку Вченому радою
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем'янчука
(Протокол № 3 від 28 листопада 2013 р.)*

Редакційна колегія:

Дем'янчук А. С. – д.пед.н., професор, академік АВШ України, голова редколегії; Борейко В. І. – д.е.н., доцент, заступник голови редколегії; Вачевський М. В. – д.пед.н., професор; Власюк А. П. – д.т.н., професор; Джунь І. В. – д.ф.-м.н., професор; Дутчак М. В. – д.фіз.вих., професор; Єрмаков С. С. – д.пед.н., професор; Мадзигон В. М. – д.пед.н., професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України; Малафік І. В. – д.пед.н., професор; Мицкай Б. М. – д.біол.н., професор; Павелків Р. В. – д.психол.н., професор, академік АВШ України, заслужений працівник освіти України; Поташнюк І. В. – д.пед.н., доцент; Приступа Є. Н. – д.пед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Цьось А. В. – д.фіз.вих., професор; Шаповал Ю. Г. – д.філол.н., професор; Шкляр В. І. – д.філол.н., професор; Шкребтій Ю. М. – д.фіз.вих., професор, заслужений працівник народної освіти України; Завацька Л. А. – к.пед.н., доцент; Коробович Л. П. – к.пед.н., доцент; Мельничук Л. Б. – к.пед.н., доцент; Пагута Т. І. – к.пед.н., доцент; Міськова Н. М. – к.пед.н., доцент, відповідальний секретар редакції; Романюк В. І. – к.фіз.вих., доцент, відповідальний секретар редколегії.

Редактор:

Ємурк М. Б., д.пед.н., професор, Національна академія педагогічних наук України; Смаклик І. О., д.пед.н., професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк;

Єнчак Г. А., д.філол.н., професор, Львівський державний університет фізичної культури; Куч О. С., д.пед.н., професор, Херсонський державний університет.

ISBN 978-966-7359-71-3

© Міжнародний економіко-гуманітарний
університет ім. акад. С. Дем'янчука, 2013